

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A VIH, VHB Y VHC

RETIRAR CUERPO EXTRAÑO

Salvo circunstancias especiales: cuerpo penetrante en ojos, etc

PROMOVER SANGRADO

Evitando contacto con la boca

LAVAR LA ZONA AFECTADA

- Agua y jabón antiséptico en **exposición parenteral y piel no intacta**
- Agua estéril, suero fisiológico o agua corriente en **exposición de mucosas**

TRATAMIENTO LOCAL DE LA HERIDA

DECLARACIÓN EXPOSICIÓN

- **Notificación al mando intermedio**
- **Parte de accidente laboral sin baja (C.A.T.I.)**
- **Buscar asistencia lo antes posible:**

VALORACIÓN DEL ACCIDENTE

INFORMACIÓN DEL CASO FUENTE (si conocido)

Extraer serología, previo **CONSENTIMIENTO VERBAL**, para solicitar **test VIH rapid y marcadores VHB, VHC y VIH** (si alguno positivo conocido, solicitar carga viral)

TIPO Y MECANISMO DEL ACCIDENTE

Tipo de Exposición	Riesgo de transmisión		
	VIH (%)	VHB (%)	VHC (%)
Pinchazo percutáneo con aguja	0,3 [0,2-0,5 IC95%]	6-30% AgHB-/+	1,8 [0-7%]
Exposición mucosa	0,009 [0,006-0,5]	Ocurre. No cuantif	Raro

Modificado de Fisher. Int J STD&AIDS 2006 (UK guideline)

VALORACIÓN DE PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN

SEROLOGÍA CASO FUENTE

TEST VIH NEGATIVO

- Si atención inicial en Urgencias, derivar a Medicina Preventiva para:
- Registrar accidente y valoración del riesgo de infección por VHB, VHC
 - Seguimiento del accidente

TEST VIH POSITIVO

SI NO INDICADA PPE

INDICADA PPE

- Si atención en Urgencias, iniciar terapia antirretroviral y:
- Derivar a E Infecciosas para seguimiento del tratamiento
 - Derivar a Medicina Preventiva para registro del accidente

PREFERIBLEMENTE EN PRIMERAS 24 HORAS
NO INDICADA TRANSCURRIDAS 72 HORAS

Lunes- Viernes
8:00 – 20:00 h

Si indicada profilaxis VIH: S. E. Infecciosas. 2ª Planta CDT. Teléfonos: 95501(31)3096-3094

Registro Accidente: S. Medicina Preventiva y SP. 6ª PI Edif Laboratorios. Teléfono: 756544

Cuándo recomendar inicio PPE

	Exposición	Fuente
Sangre	Penetración SC o IM con aguja IM/IV o sistema IV	VIH+ o desconocido con FR
	Accidente percutáneo con instrumento cortante o aguja IM/SC o sutura.	VIH+
	Contacto >15 min con mucosas o piel no intacta.	